


경부암 검사

(팍 스미어-자궁세포진검사)

경부란 무엇인가요?

경부는 자궁의 입구이며 질의 끝에 있습니다.



경부암이란 무엇인가요?

경부의 바깥은 얇은 조직층으로 덮여 있는데 이 조직을 형성하는 세포는 성장하고 변화한 후 떨어져 나갑니다. 대부분의 이 세포의 변화는 자연스럽게 정상이지만 간혹 이 세포들이 비정상적으로 변화하며 그 중에 암으로 전개되기도 합니다.

팍 스미어란 무엇이며 왜 중요한가요?

팍 스미어란 경부조직의 세포가 정상으로 변하는지 비정상적으로 변하는지를 검사하는 테스트입니다. 정기적으로 팍 스미어를 하는 것이 경부암을 예방하는 가장 효과적인 방법입니다. 팍 스미어로 정기적인 검진을 하는 것이 세포변화를 초기에 발견할 수 있는 최상의 방법으로서 세포변화가 초기에 발견되면, 이를 치료하여 경부암을 예방할 수 있습니다. 정기적인 검진으로 인해 경부암 환자의 수가 85% 감소되었습니다.

누가 팍 스미어를 받아야 하나요?

비씨주 암 관리국 및 비씨주 의학협회에서는 다음의 사항을 권해드립니다.

- 과거에 성관계를 가졌거나 현재 성관계를 계속하는 여성은 일년에 한번씩 팍 스미어를 받을 것.
- 3년동안 팍 스미어 결과가 정상이면 그 이후부터 69세가 될 때까지 2년에 한번씩만 팍 스미어를 받을 것.
- 팍 스미어 결과가 비정상적으로 나오면 다른 후속 검사 및 필요하다면 치료를 받을 것. 그 이후에 팍 스미어를 일년에 한번씩 받을 것.
- 69세이상이고 지난 10년 동안 팍 스미어 결과가 정상이었다면 더이상 팍 스미어를 받지 않아도 됩니다.
- 암이 아닌 다른 이유로 자궁적출수술 (자궁을 들어내는 수술)을 받은 사람은 정기적인 팍 스미어를 받을 필요가 없습니다.

팍 스미어는 어떻게 행해지나요?

- 골반검사 중에 의사가 스펙큘럼 (검경)이라고 불리는 기구를 질에 삽입하게 되는데 이 기구가 질을 부드럽게 열어 의사가 경부를 볼 수 있게 합니다.
- 그리고 나서 의사가 작고 납작한 기구나 브러시를 이용하여 경부조직으로부터 세포를 추출합니다. 이 작업은 매우 용이하며 보통 아프지 않습니다.

- 세포는 유리 슬라이드에 올려져서 비씨주 암관리국의 실험실로 보내어집니다.

팍 스미어를 위해 어떤준비를 해야 하나요?

- 팍 스미어 하기 전 24 시간 동안 질 안 세척을 하지 말며, 약품이나 윤활유나거품제품을 질 안에 넣지 마십시오.
- 팍 스미어는 생리와 생리 중간 즉, 월경 주기 중간 즈음에 하십시오.
- 생리 중에는 팍 스미어를 하지 마십시오.

팍 스미어의 결과는 어떻게 알 수 있나요?

여러분의 의사가 6-8 주 후면 결과 보고를 받게 될 것입니다. 결과는 다음과 같이 3가지로 보고됩니다.: 아시아 여성 건강 진료소에서는 정상이 아닌 모든 테스트결과를 서면으로 알려드릴 것입니다. 또한 다음의 팍 스미어를 언제 받아야 하는지에 대해서도 서면으로 알려드릴 것입니다.

팍 스미어의 결과가 비정상이라는 것은 무엇을 의미하는가?

그렇다고 꼭 암에 걸린 것은 아닙니다. 팍스미어 결과가 비정상적인 사람 중에 소수만이 암에 걸립니다. 팍 스미어 결과,세포가 변하는 것이 발견되면:

- 팍 스미어를 다시 받거나,
- 전문의의 검진을 받아야합니다.

아시아 여성 클리닉

경부암 검사

비씨 여성 병원

4500 OAK STREET,
우편번호 : V6H 3N1

문의사항이나
시간약속은 석썸스로
전화주세요.(영어로)
전화 : 604-684-1628



Vancouver
Coastal Health
Promoting wellness. Ensuring care.

Women's
BC WOMEN'S HOSPITAL
& HEALTH CENTRE
An agency of the Provincial
Health Services Authority

